

AMOEBYL

for amoebiasis

COMPOSITION:

Each tablet contains:

Diloxanide furoate 500 mg

PROPERTIES:

AMOEBYL tablet acts principally in the bowel lumen and it is used in the treatment of chronic intestinal amoebiasis. It is more effective than metronidazole in cyst passers.

In acute and chronic intestinal amoebic dysentery **AMOEBYL** tablet is used to supplement treatment with chloroquine and tetracycline.

It is also used in the treatment of hepatic amoebiasis in conjunction with chloroquine and dehydro-emetine.

INDICATIONS:

Acute and chronic intestinal amoebiasis.

DOSAGE:

Adults: one tablet three times daily for 10 days or more.

ADVERSE EFFECTS :

Flatulence, vomiting, pruritis, and urticaria may occasionally occur. Transient albuminurea has been reported.

CONTRAINDICATIONS AND PRECAUTIONS:

Avoid use during pregnancy.

PACKAGING:

Boxes containing 20 tablets.

Boxes containing 30 tablets.

Product of:

Medical Union Pharmaceuticals,

Abu-Sultan, Ismailia, Egypt.

Issue date: 29/8/2002, Revision date: 10/1/2013

150225017013

أميبييل

لعلاج الإصابات الأميبية

150225017013

التركيب:

كل قرص يحتوى على :

٥٠٠

مجم ديلوكسانيد فيوروات

الخواص:

يستخدم مستحضر أمبييل أقراص لعلاج حالات دوستاريا الأمعاء و بصفة خاصة الدوستاريا المزمنة. كما أنه أكثر فاعلية من مركب الميترونيدازول في علاج الأميبا المتحوصلة.

ويستخدم أمبييل أقراص مع مركب الكلوروكين والتراسيكلين ليعطي علاجاً أفضل في حالات الدوستاريا الأميبية المعوية. كما أنه يستعمل مع مركب الكلوروكين وديهيروإيميتين في علاج الأميبا الكبدية.

دوعى الاستعمال:

الدوستاريا الأميبية المعوية الحادة والمزمنة.

الجرعة:

الكبار: قرص ٣ مرات يومياً لمدة ١٠ أيام.

الآثار الجانبية :

يحدث في بعض الأحيان إنفاس ، قيء ، هرش ، إرتفاع مؤقت في نسبة الزلال في البول.

تحذيرات و مواعظ الاستعمال:

يتجنب استعماله خلال فترة الحمل.

العبوة:

علبة تحتوى على ٢٠ قرص.

علبة تحتوى على ٣٠ قرص.

إنتاج :

شركة المهن الطبية للأدوية

أبو سلطان - الإسماعيلية - مصر

تاریخ الإصدار: ٢٠٠٢/٨/٢٩، إعادة المراجعة: ٢٠١٣/١/١٠

