

150225092014

BRONEX

Oral Drops

Cough Preparation-Expectorant
Free from: Sugar, Glycols, Dyes

Composition:

Each 1ml contains:

Guaiphenesin	20 mg
Pseudoephedrine hydrochloride	20 mg

Properties:

- * Guaiphenesin reduces the viscosity of the sticky retentive respiratory tract secretions by reducing the adhesiveness and surface tension of these secretions, thereby facilitating their expectoration, without increasing the overall volume of the respiratory tract secretions.
- * Pseudoephedrine hydrochloride is an oral sympathomimetic which exerts a vasoconstrictor effect on the blood vessels of the mucous membranes when they are dilated as a result of inflammation. Pseudoephedrine also has a bronchodilator effect.
- Bronex facilitates removal of excess viscous secretions.
- Bronex improves respiratory tract airway flow.

Indications :

- * For the symptomatic relief of cough with respiratory tract infections and related conditions such as sinusitis, pharyngitis, bronchitis, and asthma, when these conditions are complicated by tenacious mucus and/or mucous plugs and congestion.

* To promote nasal or sinus drainage.

Contraindications:

Hypersensitivity to any component of the preparation, and severe hypertension.

Adverse reactions:

As with other expectorants and sympathomimetics , this drug might cause mild undesirable symptoms such as skin rashes, headache, tachycardia, nausea and vomiting.

Precautions:

- * Other medications contain sympathomimetic agents should not be taken simultaneously with Bronex.
- * Caution should be taken with patients suffering from diabetes mellitus or hyperthyroidism.
- * If symptoms do not improve within 7 days or are accompanied by fever, consult a doctor.

Dosage:

- Do not use for children less than six years old.
- Add the content of the calibrated dropper (1ml) to the preferred juice of the child every 4 to 6 hours.

How supplied:

15 ml bottle with a calibrated dropper.

Storage:

- * Store at room temperature.
- * Protect from light.

Product of:

Medical Union Pharmaceuticals,
Abu-Sultan, Ismailia, Egypt.

Issue Date: 14/5/2000, Rerevision Date: 2/6/2010



برونكس

نقط للاستعمال عن طريق الفم

مستحضر للسعال - طارد للبلغم
حال من السكر والجليكول والألوان الصناعية

150225092014



التركيب:
كل ١ ملليلتر يحتوى على:

جوافينزيرين ٢٠ مجم
سودوافيرين هيدروكلوريد ٢٠ مجم

الخواص:

- * جوافينزيرين يسهل التخلص من الإفرازات المخاطية غليظة تقوم للجهاز التنفسى عن طريق تهاب التوتر السطحي والانتساق لهذه الإفرازات بدون زيادة في كمية إفرازات الجهاز التنفسى.
- * سودوافيرين عنصر مثلك للسميثاوى ذو تأثير قابض على الأوعية الدموية حينما تتمدد نتيجة لالتهاب، كما أن له تأثير موسع للشعب الهوائية.
- برونكس يسهل التخلص من الإفرازات غليظة التهاب .
- برونكس يحسن من سريران الهواء في الشعب الهوائية.

دعاوى الاستعمال:

- * لإزالة أعراض السعال المصاحب لحالات عدوى الجهاز التنفسى مثل التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الشعب الهوائية، الربر الشعبي، احتقان البلغم عندما تكون هذه الحالات مصاحبة بغير إفرازات غليظة القaram.

* يحقق التخلص من الإفرازات سواء من الأنف أو من الجيوب الأنفية.

موقع الاستعمال:

الحساسية لأى من المكونات التى تدخل فى تركيب هذا المستحضر ، وفي حالات ارتفاع ضغط الدم الحاد.

التفاعلات المضادة:
مثل سائر الأدوية ذات التأثير السميثاوى وطاردة البلغم ، هذا الدواء نادرًا ما قد يسبب بعض الأعراض البسيطة غير المرغوبة مثل الطفح الجلدي، الصداع، سرعة ضربات القلب، العثيان والقيء.

الاحتياطات:

- * لا ينبغي استخدام المستحضرات التي تحتوى على مواد ذات التأثير السميثاوى أثناء استخدام برونكس.
- * يوصى بالحرص عند استخدام المستحضر مع المرضى الذين يعانون من البول السكري، وازدياد نشاط العدة الدرقية.

- * إذا لم تتحسن الأعراض خلال سبعة أيام أو إذا كانت الأعراض مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة
فيجب مراعحة الطبيب.

الجرعة:

- لا يستخدم للأطفال أقل من ست سنوات.
- يضاف ملء قطارة (١ مللي) إلى العصير المفضل للطفل كل ٤ إلى ٦ ساعات.

العواقب:

زجاجة عبوة ١٥ ملليلتر مع قطارة معايرة.

شروط التخزين:

- * يحفظ في درجة حرارة الغرفة.
- * يحفظ بعيداً عن الضوء.

إنتاج:

شركة المهن الطبية للأدوية
أبو سلطان. الإسماعيلية. مصر

تاريخ الإصدار: ١٤/٥/٢٠١٠، إعادة مراجعة: ٢٠١٠/٧/٢