

Acicone-S

Acicone-S
Magaldrate - Simethicone
Suspension - Chewable Tablet

Composition:

Sodium-Free / Sugar-Free

Active:

Each 5 ml suspension contains:

Magaldrate 540 mg, Simethicone 40 mg

Each tablet contains:

Magaldrate 720 mg, Simethicone 25 mg

Inactives:

Suspension: Propyl paraben, Methyl paraben, Saccharine, Polysorbate 80, Spearmint natural flavour, Sorbitol 70% solution, Propylene glycol, Xanthan gum, Methyl cellulose, Glycerin and Purified water.

Tablet: Sorbitol powder, Gelatin powder, Peppermint dry flavour, Colloidal silicon dioxide, Aspartam fine powder, Polysorbate 80, Magnesium stearate and Mannitol powder.

Pharmacological Action:

Antacid & Anti-flatulent. **Acicone-S** is an antacid containing a combination of magaldrate and simethicone as active ingredients. Magaldrate (aluminium magnesium hydroxide sulfate) is a chemical entity of aluminium and magnesium hydroxides (not a physical mixture), while simethicone (activated dimethicone) is an anti flatulent.

Acicone-S provides a true buffering action with high acid consuming properties allowing an immediate and sustained relief of symptoms associated with oesophageal and gastric hyperacidity with no alkalinization or acid rebound effect.

Acicone-S is distinguished by a strong acid insulating power forming a thin film covering the gastric mucous membranes to resist the transference of hydrogen ions across the film, allowing more protection to the wall of the stomach.

Acicone-S effectively adsorbs and binds a considerable amount of substances contained in the duodeno-gastric reflux, such as pepsin, bile acids and lysolecithin; all these substances are aggressor factors in the case of gastritis, peptic ulcer and oesophagitis.

Acicone-S thus offers a better protection to the walls of the upper gastro-intestinal tract.

Acicone-S assures a higher safety margin especially for both hypertensive and diabetic patients as being sodium-free and sugar-free, respectively.

Acicone-S shows a cytoprotective action by stimulating the endogenous prostaglandin E2 synthesis in gastric mucosa.

Acicone-S contains simethicone as an anti-flatulent which acts both in the stomach and intestine by

changing the surface tension of gas bubbles causing them to coalesce, this leads to alleviation of dyspepsia and reduction of the severity of gas pain.

Pharmacokinetics: Magaldrate is not absorbed and acts only physically in stomach.

Indications:

- Rapid relief of the symptoms of heart burn, sour stomach and acid indigestion especially those associated with accumulation of gases.

- Symptomatic treatment of hyperacidity associated with peptic ulcer, gastritis, reflux oesophagitis and hiatus hernia especially in cases of association with the accumulation of gases.

- Post-operative distension.

- Prophylaxis against ulcer complications.

Dosage and Administration:

Suspension:

1-2 teaspoonfuls, on the first appearance of the symptoms or 30 minutes to one hour after meals and at bed time or as directed by the physician.

Tablets:

1 to 4 tablets are to be chewed thoroughly or sucked, on the first appearance of the symptoms or 30 minutes to one hour after meals and at bed time or as directed by the physician

Contraindications: Hypersensitivity to any of the ingredients of the product.

Side Effects:

Mild & self-limited diarrhea or constipation, nausea, vomiting, or abdominal cramps may rarely occur.

Drug Interactions:

Not to be taken with tetracycline antibiotics.

Pregnancy and Lactation:

Category A (no absorption).

Precautions and Warning:

- Individuals with renal failure should not take this product except under the advice and supervision of a physician.

- Not to be taken for long time unless directed by your physician.

Package:

Tablets:

Box containing 5 strips.

(Each strip contains 4 chewable tablets).

Box containing 30 strips

(Each strip contains 4 chewable tablets).

Suspension:

Glass bottle containing 200 ml suspension.

Glass bottle containing 120 ml suspension.

Storage: Keep at temperature not exceeding 30°C.

Instruction to the Patient:

- Shake the bottle well before use.

- Not to be used for children less than 12 years old.

Product of: **Medical Union Pharmaceuticals,**
Abu - Sultan, Ismailia, Egypt.

Issue Date: 20/9/2004, Rerevision date: 12/8/2010



دواعى الاستخدام:

- تخفيف سريع وعلاج للأعراض المصاحبة لحالات حرقان فم المعدة.

- اضطرابات الهضم المصاحبة بالانتفاخ وآلام المعدة. - يستخدم أسيكون-إس فى علاج آلام الحموضة العالية المصاحبة لقرحة المعدة والإثني عشر وكذلك التهابات المعدة وفتاق الحجاب الحاجز.

- انتفاخ ما بعد العمليات الجراحية.

- للوقاية من مضاعفات قرحة المعدة والإثني عشر.

الجرعة والاستعمال:

المعلق: ١-٢ ملعقة صغيرة عند ظهور الأعراض أو من نصف ساعة إلى ساعة بعد الأكل وعند النوم أو حسب إرشادات الطبيب.

الأقراص: ١-٤ قرص تمضغ جيداً أو تستحلب، عند ظهور الأعراض أو من نصف ساعة إلى ساعة بعد الأكل وعند النوم أو حسب إرشادات الطبيب.

موانع الاستعمال:

فى حالات الحساسية لأى من المكونات التى يحتوى عليها المستحضر.

الأعراض الجانبية:

نادرأما يحدث إسهال بسيط أو إمساك، غثيان، قىء وأحياناً تقلص معدى مؤقت.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى:

لا يجب استخدام المستحضر مع أى من مركبات التتراسايكلين.

الاستعمال فى الحمل والرضاعة:

فئة أ (لا يحدث امتصاص).

الاحتياطات والتحذيرات:

- لا يجب استخدام المستحضر لمرضى الفشل الكلوى إلا تحت إشراف الطبيب.

- لا يجب استخدام المستحضر لفترة طويلة إلا تحت إشراف الطبيب.

العبوة:

الأقراص:

علبة بها ٥ شريط بكل شريط ٤ أقراص.

علبة بها ٣٠ شريط بكل شريط ٤ أقراص.

المعلق:

زجاجة بها ٢٠٠ مللى معلق.

زجاجة بها ١٢٠ مللى معلق.

التخزين:

عند درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠°م.

تعليمات خاصة بالمريض:

- تخرج الزجاجة جيداً قبل الاستخدام.

- لا يستخدم للأطفال أقل من ١٢ سنة.

إنتاج:

شركة المهن الطبية للأدوية

أبو سلطان - الإسماعيلية - مصر



تاريخ الإصدار: ٢٠٠٤/٩/٢٠، إعادة المراجعة: ٢٠١٠/٨/١٢

أسيكون - إس

أسيكون - إس

ماجلدرات - سايميثيكون

معلق - أقراص قابلة للمضغ

التركيب: خلال من الصوديوم والسكر.

المواد الفعالة: يحتوى كل ٥ مللى من المعلق على:

ماجلدرات ٥٤٠ مجم

سايميثيكون ٤٠ مجم

يحتوى كل قرص على:

ماجلدرات ٧٢٠ مجم

سايميثيكون ٢٥ مجم

المواد الغير فعالة:

المعلق: بروبيل بارابين، ميثيل بارابين، سكارين، بولى سوربيت ٨٠، نكهة النعناع الطبيعية، محلول سوربيتول ٧٠%، بروبيلين جليكول، صمغ الزانثان، ميثيل سليولوز، جلوسرين وماء نقى.

الأقراص: بودرة سوربيتول، بودرة جيلاتين، نكهة النعناع الجافة، ثانى اكسيد السيليكون الغروى، بودرة أسبارتام، بولى سوربيت ٨٠، ستيرات الماغنيسيوم وبودرة مانيتول.

التأثير الفارماكولوجى:

مضاد للحموضة ومضاد للانتفاخ

أسيكون-إس مركب يحتوى على الماجلدرات وسايميثيكون كمواد فعالة والماجلدرات مركب من هيدروكسيد وكبريتات الألومنيوم والماغنسيوم حيث يعمل كمضاد للحموضة، ويعمل سايميثيكون أيضاً كمضاد للانتفاخ.

أسيكون-إس له مفعول منظم وسريع كمضاد للحموضة بدون زيادة القلوية أو الارتداد الحمضى للمعدة.

أسيكون-إس يتميز بقبوة عالية لمعادلة العصارة الحمضية للمعدة كما يكون طبقة عازلة فوق الغشاء المخاطى تقاوم مرور ايونات الهيدروجين من خلالها مما يوفر حماية أكبر لجدار المعدة.

أسيكون-إس يرتبط ويمتد بفاعلية كمية كبيرة من المواد المحتوة فى السوائل المرتجعة من المعدة والإثني عشر مثل البيبسين والأحماض المرارية واللايزولبيسيثين وهى المركبات المحفزة لالتهابات وقرح المعدة والمرىء والإثني عشر مما يضمن حماية أكبر لجدار الجهاز الهضمى العلوى.

أسيكون-إس يوفر درجة أمان عالية وخاصة لكل من مرضى ارتفاع ضغط الدم والبول السكرى وذلك لخلوه من الصوديوم والسكر على التوالى.

أسيكون-إس يحتوى على سايميثيكون كمضاد للانتفاخ الذى يعمل على انكماش وتجمع فقاعات الهواء والغازات مما يساعد على تخفيف أعراض كل من عسر الهضم والمغص الناتج عن الغازات.

الحركة الدوائية:

ماجلدرات لايمتص ويعمل بصورة فيزيائية فى المعدة.