

150225089014

Acicone

Acicone

Magaldrate Suspension - Chewable Tablet

Composition:

Sodium-Free / Sugar-Free

Active:

Each 5 ml suspension contains:

Magaldrate 540 mg

Each tablet contains:

Magaldrate 720 mg

Inactives:

Suspension: Propyl paraben, Methyl paraben, Saccharine, Polysorbate 80, Spearmint natural flavour, Sorbitol 70% solution, Propylene glycol, Xanthan gum, Methyl cellulose, Glycerin and Purified water.

Tablet: Sorbitol powder, Gelatin powder, Peppermint dry flavour, Colloidal silicon dioxide, Aspartam fine powder, Magnesium stearate and Mannitol powder.

Pharmacological Action:

Acicone is an antacid containing Magaldrate as an active ingredient. Magaldrate (aluminium magnesium hydroxide sulfate) is a chemical entity of aluminium and magnesium hydroxides (not a physical mixture).

Acicone provides a true buffering action with high acid consuming properties allowing an immediate and sustained relief of symptoms associated with oesophageal and gastric hyperacidity with no alkalization or acid rebound effect.

Acicone is distinguished by a very strong acid insulating power forming a thin film covering the mucous membrane to resist the transference of hydrogen ions across the film, allowing more protection to the wall of the stomach.

Acicone effectively binds and adsorbs a considerable amount of substances contained in the duodeno-gastric reflux, such as pepsin, bile acids and lysolecithin; all these substances are aggressor factors in case of gastritis, peptic ulcer and peptic oesophagitis.

Acicone, thus offers a better protection to the walls of the upper gastro-intestinal tract.

Acicone assures a higher safety margin especially for both hypertensive and diabetic patients as being sodium-free and sugar-free, respectively.

Acicone shows a cytoprotective action by stimulating the endogenous prostaglandin E2 synthesis in gastric mucosa.

Pharmacokinetics:

Magaldrate is not absorbed and acts only physically in stomach.

Indications:

- Rapid relief of symptoms of heart burn, sour stomach and acid indigestion.
- Symptomatic treatment of hyperacidity associated with peptic ulcer, gastritis, reflux oesophagitis, hiatus hernia.
- Prophylaxis against gastritis and ulcer complications.

Dosage and Administration:

Suspension: 1-2 teaspoonfuls, on the first appearance of the symptoms or 30 minutes to one hour after meals and at bed time or as directed by the physician

Tablets: 1-4 tablets are to be chewed thoroughly or sucked, on the first appearance of the symptoms or 30 minutes to one hour after meals and at bed time or as directed by the physician.

Contraindications: Hypersensitivity to any of the ingredients of the product.

Side Effects: Mild & self-limited diarrhea or constipation, nausea, vomiting, or abdominal cramps may rarely occur.

Drug Interactions:

Not to be taken with tetracycline antibiotics.

Pregnancy and Lactation:

Category A (no absorption).

Precautions and Warning:

- Individuals with renal failure should not take this product except under the advice and supervision of a physician.

- Not to be taken for long time unless directed by your physician.

Package & Storage:

Tablets:

Box containing 5 strips

(Each strip contains 4 chewable tablets).

Box containing 30 strips

(Each strip contains 4 chewable tablets).

Suspension:

Glass bottle containing 200 ml suspension.

Glass bottle containing 120 ml suspension.

Storage:

Keep at temperature not exceeding 30° C.

Instruction to the Patient:

-Shake the bottle well before use.

-Not to be used for children less than 12 years old.

Produced by:
Medical Union Pharmaceuticals
Abu Sultan, Ismailia, Egypt.

Issue Date: 20/9/2004 , Revision Date: 12/8/2010



دواعى الاستخدام:

- تخفيف سريع وعلاج للأعراض المصاحبة لحالات حرقان فم المعدة.

- يستخدم أسيكون فى علاج آلام الحموضة العالية المصاحبة لقرحة المعدة والإثنى عشر وكذلك التهابات المعدة والمرىء وفتاق الحجاب الحاجز .
- للوقاية من مضاعفات قرحة المعدة والإثنى عشر .

الجرعة والاستعمال:

المعلق: ١-٢ ملعقة صغيرة عند ظهور الأعراض أو من نصف ساعة إلى ساعة بعد الأكل وعند النوم أو حسب إرشادات الطبيب.

الأقراص: ١-٤ قرص تمضغ جيداً أو تستحلب، عند ظهور الأعراض أو من نصف ساعة إلى ساعة بعد الأكل وعند النوم أو حسب إرشادات الطبيب.

موانع الاستعمال:

فى حالات الحساسية لأى من المكونات التى يحتوى عليها المستحضر .

الأعراض الجانبية:

نادراً ما يحدث إسهال بسيط أو إمساك، غثيان، قيء وأحياناً تقلص معدى مؤقت.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى:

لا يجب استخدام المستحضر مع أى من مركبات التتراسايكلين.

الاستعمال فى الحمل والرضاعة:

فئة أ (لا يحدث امتصاص).

الاحتياطات والتحذيرات:

- لا يجب استخدام المستحضر لمرضى الفشل الكلوى إلا تحت إشراف الطبيب.

- لا يجب استخدام المستحضر لفترة طويلة إلا تحت إشراف الطبيب.

العبوة والتخزين:

الأقراص:

علبة بها ٥ شرائط بكل شريط ٤ أقراص .

علبة بها ٣٠ شريط بكل شريط ٤ أقراص .

المعلق: زجاجة بها ٢٠٠ مللى معلق .

زجاجة بها ١٢٠ مللى معلق .

التخزين: عند درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ م° .

تعليمات خاصة بالمرضى:

- ترج الزجاجة جيداً قبل الاستخدام.

- لا يستخدم للأطفال أقل من ١٢ سنة.

إنتاج: شركة المهن الطبية للأدوية

أبو سلطان - الإسماعيلية - مصر



تاريخ الإصدار: ٢٠٠٤/٩/٢٠، إعادة المراجعة: ٢٠١٠/٨/١٢

150225089014

أسيكون

أسيكون

ماجلدرات

معلق - أقراص قابلة للمضغ

التركيب: خال من الصوديوم والسكر .

المواد الفعالة:

يحتوى كل ٥ مللى من المعلق على:

ماجلدرات ٥٤٠ مجم

يحتوى كل قرص على:

ماجلدرات ٧٢٠ مجم

المواد الغير فعالة:

المعلق: بروبيل بارابين، ميثيل بارابين، سكارين، بولى سوربيت ٨٠، نكهة النعناع الطبيعية، محلول سوربيتول ٧٠ %، بروبسيلين جليكول، صمغ الزانثان، ميثيل سليلوز، جلسرين وماء نقى .

الأقراص: بودرة سوربيتول، بودرة جيلاتين، نكهة النعناع الجافة، ثانى اكسيد السيليكون الغروى، بودرة أسبار تام، ستيرات الماغنيسيوم وبودرة مانيتول.

التأثير الفارماكولوجى:

مضاد للحموضة أسيكون يحتوى على الماجلدرات كمادة فعالة و الماجلدرات مركب من هيدروكسيد وكبريتات الألو منيوم و الماغنسيوم .

أسيكون له مفعول منظم وسريع كمضاد للحموضة بدون زيادة القلوية أو الارتداد الحمضى للمعدة.

أسيكون يتميز بقوة عالية لمعادلة العصارة الحمضية للمعدة كما يكون طبقسة عازلة فوق الغشاء المخاطى تقاوم مرور أيونات الهيدروجين من خلالها مما يوفر حماية أكبر لجدار المعدة.

أسيكون يرتبط ويمتد بفاعلية كمية كبيرة من المواد المحتواة فى السوائل المرتجعة من المعدة والإثنى عشر مثل البيبسين والاحماض المرارية واللايزوليسيتين وهى المركبات المحفزة

لالتهابات وقرح المعدة والمرىء والإثنى عشر مما يضمن حماية أكبر لجدار الجهاز الهضمى العلوى .

أسيكون يوفر درجة أمان عالية وخاصة لكل من مرضى ارتفاع ضغط الدم والبول السكرى وذلك لخلوه من الصوديوم والسكر على التوالى .

الحركة الدوائية:

ماجلدرات لايمتص ويعمل بصورة فيزيائية فى المعدة .