# Akneroxid<sup>®</sup> 5

150225040013

Gel

## **Benzoyl Peroxide - Acne Therapeutic**

## Composition:

Each 100 g Akneroxid 5 Gel contains: benzoyl peroxide 5 g.

#### Properties:

Akneroxid 5 Gel is a cosmetically satisfactory and skin-compatible preparation.

Akneroxid 5 Gel has 3 mechanisms of action for the treatment of acne:

Akneroxid 5 Get has 3 mechanisms of action for the treatment of acr mild desquamating, antibacterial and antiseborrheic action.

**-Desquamating effect:** a positive influence is exerted on the disturbances of keratinisation occurring in the orifices of the sebaceous glands in acne.

- -Antibacterial effect: It inhibits the growth of propioni bacteria.
- -Antiseborrheic effect: The quantity of sebum which is practically always increased in acne is reduced. It has mild desquamating effect which is frequently associated with a therapeutically desirable mild irritation of the skin.

Akneroxid 5 is well tolerated by the skin by virtue of the employed gel base. Indications:

inflammatory and non inflammatory acne.

#### Contraindications:

- Hypersensitivity to benzoyl peroxide. The risk of sensitization by benzoyl peroxide is low being less than 2%.
- -Avoid contact with the eyes or mucous membranes.
- -Avoid sun exposure after using.

#### Side effects:

At the beginning the effect of **Akneroxid 5 Gel** can be associated with a sensation of tautness and slight redness of the skin during the first days of treatment. The mild burning which occurs initially in patients with sensitive skin normally disappears during the course of treatment. If excessive redness and burning persist for longer than five days the medicament should be discontinued and the physician consulted. In many cases treatment can be continued when these manifestations have regressed with less frequent application. Marked dryness of the skin can occasionally occur on employment of **Akneroxid 5 Gel**.

## Dosage and mode of application:

Unless otherwise directed by the physician, the preparation is applied once to twice daily. However in many cases it is advisable, at least initially, to individualize the frequency of application, depending on the sensitivity of the patient's skin. In patients with particularly sensitive skin it is advisable to start therapy with **Akneroxid 5 Gel** and to apply it initially once daily before retiring. After cleansing with a medicinal detergent, **Akrieroxid 5 Gel** is applied sparingly to the affected cutaneous regions. Empirically the average course of treatment covers 4 to 10 weeks.

#### Special notes:

Benzoyl peroxide has a bleaching effect.

- 1- Avoid contact with hair
- 2-Avoid contact with coloured fabrics.
- 3- Do not store Akneroxid 5 Gel above 25°C.
- 4- Drugs should be kept carefully and out of the reach of children.

Presentation: Tube containing 20 g.

Produced by:

Medical Union Pharmaceuticals,

Abu Sultan-Ismailia-Egypt.

Under Licence From:

Hermal - Germany



150225040013

# اکنیــروکسیــد <sup>©</sup> ه

نزويل بيروكسيد - لعلاج حب الشباب

#### لتركيب:

كل ١٠٠ جرام من الچيل تحتوى على بنزويل بيروكسيد ٥ جم.

#### الخوادس:

اکنیر وکسید ٥ چیل یحتوی علی مادة فعالة بنزویل بیر وکســید ولذلك فهو ذو تأثیر ثلاثی قی علاج حــب الثمال

١- مزيل لقشور الجلد: وله تأثير قعال في الإضطر ابات التي تصيب الغدد الدهنية نتيجة لوجود حبب الشباب و بالتالي تؤثر على عملية بناء الجلد.

٢- مضاد للبكتريا: يخفض من نمو البكتريا التي تعتبر في معظم الحالات السبب لوجود حب الشباب.

٣- مضاد للسيبوريا (زيادة إقر از الدهون):

يقلل من كمية الدهون التي تفرز من البشرة و التي تزيد عادةً في وجود حب الشباب. أكنير وكسيد ٥ يتحمله الحلد نصور ة حسنة لو حوده في قاعدة حيل.

#### دواعي الاستعمال:

لعلاج حب الشياب.

### الحرعة وطريقة الاستعمال:

من مرة إلى مرتبن بو مبأ أو حسب إر شادات الطبيب.

- في حالات المرضي الذين يعانون من حساسية في الجلد يستعمل مرة و احدة يومياً.

- ينظف الجلد جيداً أو لا ثم يستعمل الچيل.

- مدة العلاج تتر اوح من ٤ - ١٠ أسابيع.

## نواهي الاستعمال:

احتمالات الإصابة بحساسية من البنزويل بيروكسيد لا تتعدى ٢ %. ولكن يجب عدم استعماله في حالات الحساسية لمادة بنزويل بيروكسيد.

يجب عدم التعريض للشمس خلال فترة العلاج.

يجب عدم ملامسته للعين وللاعشية المخاطية.

## الأعراض الجانبية:

قد يحدث احمر ارفى الجلد فى الأيام الأولى من العلاج للمرضى ذوى الجلد الحساس. هذه الاعراض لا تتوم وتختفى خلال فترة العلاج ولكن إذا استمرت أكثر من خمسة أيام يجب إيقاف العلاج واستشارة الطبيب.

نادراً ما يحدث جفاف للجلد عند استعمال أكنير وكسيد ٥ چيل.

#### الاحتياطات

١- لايستعمل أكنير وكسيد ٥ چيل عند بصيلات الشعر أو منطقة الحاجبين و لا يوضع على أنسجة من
القماش الملون لتأثير ٥ على الألوان.

٢- لا يحفظ أكنير وكسيد ٥ چيل عند درجة حرارة أعلى من ٢٥ م.

٣- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

# العبوة:

أنبوبة تحتوى على ٢٠ جرام من الچيل.

إنداج :

شركة المهن الطبية للأدوية

الإسماعينية - أبو سنطان -

. شدكة هد مال – ألما

