



Hi-Cal Forte Syrup

A Palatable & Readily Absorbable High Calcium Supplement.

150225097013

Composition:

Each 5 ml. contains 1.8 gm. calcium glubionate, a mixture of calcium lactobionate & calcium gluconate, equivalent to 115 mg. elemental calcium.

Properties:

Calcium is an essential element for maintaining the electrolyte equilibrium & for the proper function of many vital regulatory mechanisms including cardiovascular, neural and muscular performance within the body.

Hi-Cal Forte syrup contains a high amount of calcium glubionate, which is a readily absorbable calcium salt, in a palatable syrup, assuring adequate & convenient calcium supply.

Hi-Cal Forte syrup is used for the treatment & prophylaxis of acute & chronic calcium deficiency states & disturbed bone metabolism, in children & adults.

Hi-Cal Forte is free from propylene glycol, which has been restricted in pharmaceutical preparations intended for children, a virtue of **Hi-Cal Forte**.

Indications:

1. Treatment of calcium deficiency states such as:

- * Rickets & osteomalacia.
- * Osteoporosis e.g. senile, postmenopausal & corticosteroid induced.
- * Latent tetany.
- * Hypoparathyroidism & pseudohypoparathyroidism.
- * Chronic renal failure.

2. Prophylaxis, as a dietary supplement whenever dietary calcium intake is inadequate, especially in states of increased calcium demand & as in:

- * Childhood.
- * Adolescence.
- * Pregnancy & Lactation.
- * Perimenopausal females.
- * Elderly.
- * Long use of antiepileptic or corticosteroid therapy.

3. Supportive treatment in allergic conditions.

Contraindications:

- Acute renal failure.
- Severe hypercalcaemia & renal calculi.
- Hypercalcaemia & Hypervitaminosis -D.
- Hypersensitivity to any of the components of **Hi-Cal Forte** syrup.

Precautions:

Calcium should be given cautiously to patients with impaired renal function or diseases associated with elevated vitamin D concentration, plasma calcium concentration should be monitored closely in those patients.

Adverse Reactions:

Hi-Cal Forte syrup - being readily absorbable - is exceptionally well tolerated. Mild GIT symptoms such as, constipation, anorexia, dryness of mouth, thirst, vomiting or abdominal pains may rarely occur with oral calcium preparations. However those side effects are much less common with **Hi-cal Forte** syrup than with other less absorbable forms of oral calcium salts.

Interactions:

- Calcium enhances the effect of digitalis glycosides and may precipitate digitalis toxicity.
- Calcium reduces the absorption of a number of drugs e.g. fluorides, fluoroquinolones & tetracyclines: so administration should be separated by at least 3 hours.
- Thiazide-containing diuretics increase the renal reabsorption of calcium, thereby may lead to hypercalcaemia.

Dosage & Administration:

- Children:
 - Up to 3 years: 1 to 3 teaspoonful daily.
 - More than 3 years: 1 to 2 tablespoonful daily.
- Adults: 1 to 2 tablespoonful daily.
 - Pregnant & lactating females: 1 to 3 tablespoonful daily.
 - Postmenopausal females: 1 to 3 tablespoonful daily.
 - Elderly: 1 to 2 tablespoonful daily.

N.B. **Hi-Cal Forte** is better to be taken just before meals to enhance its absorption.

Treatment dose could be individualized by the physician, according to the severity of calcium deficiency.

How Supplied:

Bottles of 100 ml.

Storage conditions:

Store at a temperature not exceeding 30°C.

Avoid freezing.

Manufactured by: Medical Union Pharmaceuticals,

Abu-Sultan, Ismailia, Egypt.



هاي - كال (فورت)

150225097013

شُرَاب

هاي - كال (فورت) شراب حسن الطعم يحتوى على كلسيوم عالي التركيز وسهل الامتصاص.

التكوين:

كل ملعقة صغيرة (٥ مللي) تحتوى على ١,٨ جرام من جلوبيونات الكالسيوم والمكافئ لـ ١١٥ مجم من عنصر الكالسيوم.
الخواص:

الكالسيوم عنصر أساسي للإم للحفاظ على توازن الأملاح ولولادة السليم للعديد من الأليات التنظيمية بالجسم. **هاي - كال** (فورت) يحتوى على أملاح جلوبيونات الكالسيوم وهي أملاح سهلة الامتصاص، في صورة شراب حسن الطعم وبتركيز مناسب لمنع وعلاج مختلف حالات نقص الكالسيوم الحاد والمزمن وكذلك علاج مختلف أشكال اضطراب التمثيل الغذائي للعظام في كل من الأطفال وكبار السن.

أحد مميزات **هاي - كال** (فورت) الهامة أنه خال من مادة بروبيولين جلوكول لذا فهو آمن في الأطفال.

دواعي الاستعمال:

- ١ - كسمل غذائي لتعويض نقص الكالسيوم بالغذاء، خصوصا في مراحل ازدياد الحاجة للكالسيوم ، مثل:
 - الأطفال في مرحلة النمو.
 - مرحلة النرافة.
 - أثناء فترة الحمل والرضاعة.
 - الوقاية من زيادة فقد المعادن من العظام قبل وبعد انقطاع الطمث، وفي كبار السن أو أثناء استعمال عقار الكورتيزون أو مضادات الصرع.
- ٢ - علاج حالات نقص الكالسيوم المصاحبة للأمراض الآتية:-
 - هشاشة العظام الراجع لأسباب مختلفة مثل انقطاع الطمث، تقدم السن، العلاج بالكورتكوستيرويدات.
 - الكساح ولين العظام.
 - التكرز الكامن (تشنجات نقص الكالسيوم) والاضطرابات العصبية العضلية المصاحبة ، الناتجة عن نقص الكالسيوم.
 - نقص نشاط الغدة جار الدرقية.
 - الفشل الكلوي المزمن.
- ٣ - علاج وتدعيمي في أمراض الحساسية.

مواع الاستعمال:

- زيادة الكالسيوم أو فيتامين د بالدم.
- الحماضى الكلسية بالكلية.
- الفشل الكلوي الحاد.
- فرط الحساسية لأى من مكونات الدواء.

الأعراض الجانبية:

شراب **هاي - كال** (فورت) "جلوبيونات الكالسيوم" نادرا ما يحدث أعراض جانبية بالجرح عات العادية.

في أحوال نادرة قد يحدث اضطرابات بسيطة بالجهاز الهضمي، مع أملاح الكالسيوم التي تؤخذ عن طريق الفم، مثل تلك الأعراض الجانبية تكون أقل مع استخدام شراب **هاي - كال** (فورت) عما إذا استخدمت أملاح الكالسيوم الأخرى الأقل امتصاصا من الجهاز الهضمي.

الاحتياطات:

يجب أخذ الكالسيوم بحذر لمنرضى قصور وظائف الكلى، أو في الأمراض المصاحبة لزيادة تركيز فيتامين د بالدم. لهؤلاء المرضى يجب استشارة الطبيب لمتابعة قياس تركيز الكالسيوم بالدم بصورة دورية.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى:

يجب مراعاة الجرعة وتوقيتها عند تناول أى من العقاقير التالي ذكرها:

- الكالسيوم يزيد من تأثير عقار الديجيتاليز.
- الكالسيوم يقلل بمتصاص بعض العقاقير مثل الفلوريد "الفلوروكينولونات" والتتراسيكلين، لذلك يجب إعطاء الكالسيوم بفارق ثلاث ساعات على الأقل عن إعطاء تلك العقاقير.
- مدر البول من نوع الثيازيد يزيد إعادة الامتصاص الكلوي للكالسيوم مما يؤدي إلى زيادة نسبة الكالسيوم في الدم.

الجرعة وطريقة الاستخدام:

- الأطفال:
 - الأطفال حتى ثلاث سنوات: ٣-١ ملعقة صغيرة (٥ مل) يوميا.
 - الأطفال فوق ثلاث سنوات: ٢-١ ملعقة كبيرة (١٥ مل) يوميا.
- البالغين:
 - المرضعات والحوامل: ٣-١ ملعقة كبيرة (١٥ مل) يوميا.
 - فترة ما بعد انقطاع الطمث: ٣-١ ملعقة كبيرة (١٥ مل) يوميا.
 - المسنين: ٢-١ ملعقة كبيرة (١٥ مل) يوميا.

ملحوظة:

شراب **هاي - كال** (فورت) يجب أخذه قبل الوجبات مباشرة وذلك لتحسين امتصاصه.

يمكن للطبيب تغيير أو زيادة الجرعة حسب حالة المريض وتبعاً لشدة نقص الكالسيوم.

شروط التخزين:

- يحافظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية.
- تجنب التجميد.

العبوة:

زجاجات بها ١٠٠ مليلتر شراب.

إنتاج:

شركة المهن الطبية للأدوية

أبو سلطان، الإسماعيلية، مصر

