Moxacin 400 mg

Film Coated Tablet

Generic name: Moxifloxacin 400mg.
Road the entire patient information leaflets carefully before taking the medicine. Keep the patient information leaflet - you may wish to read it again later.

Keep the patient information iselfed - you may wish to read it again later.

If you have any further questions, legisce consult your doctor or pharmaculi.

This medicine has been prescribed to you personally and should not be given to other patients. It may cause harm to other people, even if they share the same symptoms as you.

This patient information leafled concerns the following: 'What is able effective.' What is able effective in the patients are should you be averee of before taking Moxacin 400 mg film coated tablets as the harmonic of the patients. It was able effective in the patients are should you be averee of before taking Moxacin 400 mg film coated tablets to should will be able to the patients. It was able effective and the patients are should be able to the patients are should be able to the patients. It was able effective as the patients are should be able to the patients. It was able effective as the patients are should be able to the patients are should be able to the patients. It was able effective as the patients are should be able to the patients. It was able effective as the patients are should be able to the patients. It was able effective as the patients are should be able to the patients. It was able effective as the patients are should be able to the patients. It was able effective as the patients are should be able to the patients. It was able effective and the patients are should be able to the patients are should be able to the patients. It is considered in patients are should be able to the patients are should be used only when it is considered in patients are commonly recommended for the initial teatment of these infections or when these have falled:

Acta teacernal annuality, adequately diagnosed.

**Acta teacernal

- Acute bacterial simustics, desquately diagnosed).

- Acute assocrations of chrone surrournay auto-pure purpose.

- Community acquired personness, corport sever cases.

- Community acquired personness, corport sever cases.

- Community acquired personness, corport sever cases.

- Community acquired personness corport sever cases.

- Community—acquired personness cases.

- Community—acquired personness cases.

- Community—acquired personness cases.

- Community—acquired personness.

Mozain 400mg fifth coated tablets are not recommended for use in monotherapy of mild to moderate paths in contrasting Mostocacin resistant Nessiatia gonomics unless Modificacion resistant Nessiatia gonomics under subdividual programments of the common support of the contrasting programments of the contrasting programment of the

and drinks: The effects of Moxacin 400 mg film coated tablets are not influenced by food, including dairy products 1. HOW SHOULD Moxacin 400 mg FILM COATED TABLETS BE TAKEN?

1. HOW SHOULD Moxacin 400 mg PLIX COATED TABLETS BET AREN?
Adults The recommended does in or will only might cannot be able choose daily and a patients with mid to severely impairer renal function or in patients on chronic dialysis. Le hermodialysis and continuous ambulatory perfloreed dialysis.
Renathepatic impairment No adjustment of doesege a required in patients with mid to severely impaired renal function or in patients on chronic dialysis. Le hermodialysis and continuous ambulatory perfloreed dialysis.
Renathepatic impairment No adjustment of the patients with the patients with box body weight. Pediatric population Mostificos continuous and in the patients with the patients with box body weight. Pediatric population Mostificos (Method of administration: The film coated tablet should be seval-lowed whole with sufficient fluid and may be taken independent of meals.

Duration of administration: Moxacin 400mg film coated tablets should be used for the following treatment durations:

- Acute exacintation of chronic bronichies 5-10 days.

- Acute exacintation of chronic bronichies 5-10 days.

- Community acquired preunomin 10 days.

- Patient of the patients of the patients of the patients of the following treatment durations:

- Patients of the patients of

If you have forgotten to take Moxacin 400 mg film coated tablets: You should take the next film-coated tablet immediately and continue your treatment with one film coated tablet a day

If you have forgotten to take Moxacin 400 mg film coated tablets. You should take the next film-coated tablet immediately and continue your treatment with one film coated tablet a day.

Do not take a color for the single does you missed.

Effects of discontinuing treatment with Moxacin 400 mg film coated tablets and the second of the coated tablets.

Effects of discontinuing treatment with Moxacin 400 mg film coated tablets of the second your doctor if you want to dop taking Moxacin 400 mg film coated tablets before the end of the coarse of treatment.

4. WHAT SIDE EFFECTS ARE POSSIBLE? Used all medicines, Moxacin 400 mg film coated tablets and an area set of the second of the se

yous system: Frequently: Drowsiness

Occasionally: Insomnia, dizziness, nervousness, sleepiness, anxiety, trembing, paraesthesias (pins and needles in the arms and legs), confusion, depression.

Rarely: Hallucinations, depersonalisationation (alteration in the perception of the self), impaired coordination, restlessness, sleep disorders, abnormal dreams, convulsions.

Very rarky: Psychotic reactions.

Advantages are requestly. Nausea, darkness, venting, dyspepsis (digestion disorders).

Gastrointestinal fract. Frequently: Nausea, darkness, venting, dyspepsis (digestion disorders).

Gastrointestinal fract. Frequently: Nausea, darkness, venting, dyspepsis (digestion disorders).

Very rarky: Psychotion remains on the mouth, inflammation of the color caused by Clostridium difficile, a specific bacterium; in extremely rare cases, with life-threatening complications), hepatitis (inflammation of the lever, primarily mouth of the color caused by Clostridium difficile, a specific bacterium; in extremely rare cases, with life-threatening complications), hepatitis (inflammation of the lower, primarily mouth of the color caused by Clostridium difficile, a specific bacterium; in extremely rare cases, with life-threatening complications), hepatitis (inflammation of the lower, primarily mouth of the color caused by Clostridium difficile, a specific bacterium; in extremely rare cases, with life-threatening complications), hepatitis (inflammation of the lower).

caused by obstruction of bile).

Gradinovascular Frequentry, in political with operation by postulational (decreased political with profit and profit of the Torquentry). Occasionally Tutypartial (packing pulse), peripheral oederna Cardinovascular Frequentry, in political poli

reaguratory organic Occasionally, District most eight party Transformation of the tendors), key rarely, Rugtured tendors, and the support of the support of

requires, requires, requires, requires, requires, requires of control and to take processing of control and to take of the sense of control of the sense of termil of loss of the sense of control of control and to take the sense of control of the sense of termil of loss of the sense of control of control of the sense of termil of loss of the sense of control of the sense of the sense of the sense of control of the sense of control of the sense of control of the sense of the sense of the sense of control of

Inform your doctor or pharmacist if you notice any side effects that are not listed in this natient information leaflet

Postmarketing experience: Exacerbation of myasthenia gravis.
5. HOW SHOULD Moxacin 400 MG FILM COATED TABLETS BE STORED?

5. HOW SHOULD Moxacin 400 MG FLM COATED TABLETS BE STORED?

- Keep medicines out of the resch of children - Do not store at temperatures above 30°C, Keep the tablets in their original packaging - Do not remove the film coated tablets from the packaging until just before you take them. The eapily due for this product is prefuted on the catchedre of case and the biblish ratips. Do not use the product after this date.

This is a medicament

- A medicament is a product which affects your health and its consumption contray to instructions is dangerous for you.

- Flow writing the doctors prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

- The declar and the pharmacist are experts in medicine, is benefits and risks.

- Do not typ voursel internst. It is benefits and risks.

- Do not typ voursel internst. It is benefits and risks.

- Do not yoursel internst. It is benefits and risks.

- Response to the pharmacist are supported in medicine, is benefits and risks.

- Response to the pharmacist are supported in medicine, is benefits and risks.

- Response to the pharmacist are supported in medicine, is benefits and risks.

- Response to the pharmacist are supported in medicine, is benefits and risks.

- Response to the medicament.

- The declar and the pharmacist are supported in medicine, is benefits and risks.

- Response to the medicament.

- The declar and the pharmacist are supported in medicine, is benefits and risks.

- Response to the medicament.

- The declar and two pharmacist are supported in medicine, is benefits and risks.

- The declar and the pharmacist are supported in medicine, is benefits and risks.

- The declar and the pharmacist are supported in medicine, is benefits and risks.

- The declar and the pharmacist are supported in medicine, is benefits and risks.

- The declar and the pharmacist are supported in the medicine in the product of the supported in the supported in the pharmacist are supported in the supported in the supported in the supported in

Issue date: 13 / 3 / 2007 ,Revision date: 25 / 8 /2013







150225160014

موكساسين ٤٠٠ مجم

٢. ما الذي يجب مر اعاته قبل تناول موكساسين ٢٠٠ مجم اقر اص مغلقة؟

مری می به برای می در این می در این می در کسی بر ویل میش سازلوز ، لاکنوز مونو هجرات، مشیارات انساعتیسوم، بودرة اللثان، ثانی لکنید الفوتد المودر بولمی سروییت ۱۰۰۰ بولمی اینتمان طبیعی است. انسواد الفیل قصلة سلطوز علق التاره نشا جارتیم لات صوروب همهروکسی برویرا میشان سیال اور در التاره می است.

إُحتَفَظ بَنْشُرة مُعلومات المُريض - قد تَر غُب في قراءتها مرة أخرى فيما بعد

إذا كان أديك أي أستفسارات أضافهم، برحمي استشكرة طبييك أو الصحيد لاس.
 هذا الدواء تم وصفه لك شخصها ، ولا يجب إن يعطى لطرف ثالث حيث أن تلك يمكن إن يسبب للضرر له، حتى لو كان يشار كله في نفس الأعراض.

هذه نشرة معلومات للمريض تتعلق بما يلي: ۱. ما هو موکساسین ۶۰۰ مجم أقر اص مخلفة و لأی غرض بستعمل؟ ۲ کیف بجب تناول موکساسین ۶۰۰ مجم أقر اص مخلفة؟

بعان التركيب؛ أقراص مغلقة، يحتوى كل قرص على:

ة. ما هي الأثار الجانبية التي يمكن ان تحدث . كيف يجب تخزين موكساسين ١٠٠ مجم اقراص مغلفة؟

- إذا كنت تعانى من عدم الزان الاملاح، خاصة إذا كان لديك تركيزات قليلة من البوتاسيوم في الدم (نقص بوتاسيوم الدم) - إذا كان لديك حالة مكتسبة خلقية أو تم اثباتها مصاحبة بشنوذ محددة لرسم القلب الكيرباني (استطالة لفترة QT)

- إن تكل تبليد المتحصية الرام الميانية المتحدة القدر المنافية مثل من المتحدة المتحدة لقرارة إلى) - إذا كان تبليد هذا قطرة كالتينيكا لبلدا القدر إلماء في معثل مرحة القدرا . - إذا كان طبيبك المعلج قام يتشخوص مثاثثه بأن لتيك قتل القلب العطير الكليتيكياً مع انفقاض كبير في الكمر القافي للبطين الأيسر (قلب ضعيف) - إذا كان لديك تاريخ من أعر انس عدم انتظام ايقاع القلب.

د کا کل شبیقه استفراهی همتند باین تبدنه نما نصاب مصدور موضوع خده مصدور می مصرحمی میسید، بحر رجب سیسید) - لا بعب تارکز وکستانی کا برای باز کام کامل خیر نظر فی زیر مقال کامل برای استفاده نظر از اکثر می نظر انداز کام - کرد بعد نظر می طاقی و دفاعت افغاد رختیانه بین امسیف القیاد (در به ع) از رفاع مساوی از برای شرای استفیاد رصد انظیمی - لا بعب نظر میکسانت ، حمر افزین مقداله کامل شرای امامل و از این شرای امامل و از این از معامل کامل انداز در انداز

سُواطات خاصة أثناء استعمال موكساسين ٤٠٠ مجم أقراص مغلقة في الحالات الأنهة: • لو كنت قد تعرضت لأى حالة تشنج في الداضي يجب استشارة طبيبك المعالج قبل تناول موكساسين ٤٠٠ مجم.

- با علیت من آی تصفر این آن می قرونه او تکلیت علیه بیست علیه استفاده علیه احتمالی العین الی احدار - قابلت وافراق رمان قالز بریک درخیان العالم العالم

 إن تناول موكسيقوكساسين يسبب استطالة قترة الQTc في رسم القلب الكهربائي في بعض المرضى مع إن التأثير غير واضح. · موكساسين · · ؛ مجم يجب ان يتم تتاوله بحدر إذا كنت تتتاول أدوية أخرى يمكن أن تقلل من مستوى البوتاسيوم في الدم

- موسسی بر میں میں جیسر رب سے سوری پر مروض میں میں سوری موسومی کی سوری موسومی کی اور میں ان موسومی کی اس اور ا - اسریضی فرو اختمال مرفع رخطرو عمر انتظام ایفاع الفسر فرال قا۔ اسروم احداد المصافح احداد المصافح الموسومی احداد المصافح الموسومی الموس

- أو أن أحراس حم انتقام يقاع القب حدث ثناء فرز العلاج بمرعسلين، توقف عن العلاج واستشر طبيباً. الكند تعلق من طالى ورفقف لكود المل طبيعة لمحمد طبي - المحادات الحيورة بعد الموطنة المسافرة على المباورة على المهاشيد (الفهات القران) في هذا الحالة، يجب الامراع في اتخذا اجراءات علاجية مناسبة

• في ملة حدوث البيال شديد الناء أو بعد استخدام فصفاتات الجويارة من فضاف استرطيقك في الحدال كافلة أورية شيطة لحركة الإمداء (الحدادة). • إذا تر التشخيص لك أولان فرد من أفراد أسرتك بالإصبابة بتضمن نازعة ميداروجين الجواريز - • في سفات (و هر مرض خلقي أومكنسب ينتج عن انسطرايات في عسلية الأبيض) ، «برجاء لخطار طبيبك بننك قبل النبه في تنازل موكساسين ٠٠٠ مجر

• على مكن القولون الأولى في ويخط في الانقراد ان المركسية لكسان الرائدة الله أي نظرور ثليوة تنتج من مسلمية التعرض اللمن ويكل غي من تلك عند الدار موكسان ١٠٠ مع الراض مظاف يجب أن تتجب التعرض الأمادة أوق بقسية (المنه اللمس في الارتفاعات العالمية) که تعدمت کردکه کل فرهساسیهٔ و نفاخت مثل (الحام الجدی) بعد تقال آران هر عد من الکیار اون روز عد من الکیار اون روز می من الدارات انداره چد آد تنظیر حساسیهٔ جاده راهاجه از په الی حد الصنعه التی تبدد الحیاة ، فی هذه العلاق جیدب التوقف عن تقارل موکساسین ۱۰۰ حجم الی الحال کما بجیب

عبه من صحح المصحود. الحمل: يجب دائما عليك استشارة طبيبك أو الصينلي قبل تناول العلاج لا يجب تناول أقراص موكساسين ٤٠٠ مجم مخلفة اذا كنت حاملاً.

الرضاعة: يجب دائماً استشارة عليبيك أو الصيدلي قبل تقارل أي علاج لا يجب تناول أقراص موكساسين ٠٠٠ مجم مخلفة خلال فترة الرضاعة. القيادة واستخدام الألام: إذا شعرت بدوار بعد تناول موكساسين ٠٠٠ مجم أفراص مغلقة تجنب القيادة واستخدام الألات.

مطومات هامة يجب معرفتها قبل إستخدام موكساسين ٤٠٠ مجم (أقراص مظفة):

هنوان تقديم المواقع المستقدة موافعات - 1 هم والواس مطاقة أي المتعادل المستقد المستقدة المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقدة المس التيطة بمعدل أكبر وغيط هرضاف التعلق على الإطلاع كياهر اء احتياطي لا يحت كاخلات دو لها، خط القران تقال مرفان المنافي المنافق التيوفيات (يستخدم القران تقال مرفان (يستخدم القران الدول المنافق التيوفيات (يستخدم القران الدول التيوفيات (يستخدم في علاج الرويل (يستخدم في علاج عدوى القطريات). عند تفاول موكمماسين ٢٠٠ مجم أقراص مطفة مع الطعام والشراب: إن أفراص موكساسين ٢٠٠ مجم المغلفة لا تتأثر بالطعام، وذلك يشمل منتجات الألبان

الما يوسي المالي وكسانيين ٤٠٠ مجم أفراص مغلفة بناء على تخليمات طبيب من فضلك استشر طبيبك أوالصيدلاني لو كنت غير متأكد من طريقة تداول الدواء يجب تداول موكسانيين ٤٠٠ مجم أفراص مغلفة بناء على تخليمات طبيب من فضلك استشر طبيبك أوالصيدلاني لو كنت غير متأكد من طريقة تداول الدواء يجب تداول موكسانيين ٤٠٠ مجم أفراص مغلفة عن طريق تحقورات واختياطات بينمي عدر استخدار المستحدرات الدي تعلى داخليا والحدورية على أحد العراد المستمحد يفرق المخاطر الهرعة المختلة هم كما بلي. إلا أنا وصف ف الطبيب خلاف فلك. البادين ترم در واحد موكساس و وعد مجره الراس مغللة مرة واحدة يومياً

موج متعاهد بن دوست در به وروست در به المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع ا وكج حدة الميد الوحة المواقع ال 2 جحدة المواقع الم

- النَّهَابُ جِهَازُ النَّنْفِي السَّطْنِي (النَّهَابُ الشُّعْبُ الْهُوانِيةُ): ٥ - ١٠ أيالم

م يوري . - الاقتبار الرفري (المكتب من المجتمع): ١٠ أيام. - الثهاب منطقة ألحوض عند العراة (النهاب الغزه العارى التناسلي متضمناً النهاب القرات فالرب والتهاب الأعشية المخاطبة المرطنة الرجر (١٤ يوم). التهاب الجيب الحاد (التهاب الجيوب الجار الألفية): ٧ أياء من فضلك نأتك من إنمأم علاجك بهوكمساسين 🚥 أطليجوا أو الرواص مغلقة. وإلا فلن يتيون الشقاء من العدوى ثابر لو كلت لاد نشاولت كنمية من موكساسين 🚥 مجم ألواضّ مغلقة أكبر من المغروض تفارلها لا أجيب تجارز الجرعة الموصفي بها رهم أقرض واحد يوما أو ما الخطأ تلفاوات أكثر من مصف عند من رهم عديب بموضفاتين ٢٠٠٠ منوبر م مراض مصف ورد من موضوف لك. من قرص واحد، يجب أن تستكمل علاجك في اليوم التالي كالمعتاد كما هو موضوف لك.

المتقدا الكرون المنشط في نف الواتح مع ١٠٠٠ واليوم مركينهاؤ تصامين بقل الاتامة الحيوية للمركينهاؤ تصامين الهي أكثر من ٨٠٠ ٪ إن التداول المبكر للكرون المنشط بيكن أن يكون مفيد لينجع الزيادة في مستويات موكسياؤ تصامين في الدم لد تم تداول جرحة زائدة من

لو كفت أله تسبيه تفاول موكساسين ٤٠٠ مهم أقراص مغلقة: يجب عليك تناول القرمي الثالي (الجرعة الثالية) في الحال واستكمال علاجك كالمعتاد بقرمي واحد يومياً. لا تتفاول جرعة مضاعة لتعويض الجرعة التي نسيتها

تأثير عبر إنصال العلاج بموكساسين ١٠٠ مجم الراس ذات كمدوة غشائية؛ إذا ترفقت عن تقابل أأو اص مركساسين ١٠٠ مجم الراس مغلقة، ممكن ان تزداد الحدلة سرءاً. من فضلك استشر طبيبك إذا كانت تريد التوقف عن العلاج بموكساسين ١٠٠ ملجم الراس مغلقة إلى نهاية المحددة الملاج.

ة , ما هم الأفراه فيها في تصفيه مثل كل الأدوية موكساس * 5 مجر افراس مثلة سكن ان يكون له اللر جلبية كشخته معذات الحدث القيد تقلير الأثر الجلبية: مكرر جاء الكارس أنهي ، مرضي ميغيرون من حين الإنبال من أنهي ، • 1 وكل أكثر من أنهي * • 1 مرضي يعاقبون

مرتفی بخر رسای به روید طرف برخی در طرفت پمجوری و الاستوان و الاستوان الم الاستوان الم الاستوان الم الاستوان الم الاستوان الم الاستوان المستوان الم الاستوان المستوان المستوان

ميهور مسين مدور مورد (نصورايات في ادراك الشخصية) خلل في التراقق عم الارتياح، اضطرابات في النوم احلام غير طبيعة وتلشجات الدراً جداً. تفاهلات تفسية دلارة طريعة والقضل الفساء فيء، عبر البيضم (اضطرابات في علية الهشم)

دههر مهمین دسرز عین میدن می در ایش (هند ایک می عله کیشد). امیلا: چشن های می است استان می این دارسته الفیاد الیاب الدین با کنید المنظم الدین الدین الدین الدین الدین الدی دار دا: اللین الفران المشکل الدین الدین الدین بسب به کشرمی وابیان لی دارستان می مناطقه الدین اللیاب الدین الدی

المواقع ال نادر أن تمدد و عائي (تمدد الأو عبة ألدموية)، ضغط دم متخفض، اغماء (اغشاء قصير) مرت کے حصر محمد روی حصوب محمد معصوب بعد ارتباط واضحه عضویا عنز اجتاز حصر المعرف الموقع المعرف على المعرف ا

البطنة أحياتياً . طفح جاندى، حكة فمى العائد (هرش)، عرق، حكاف جاندى (ترتيكاريا) نادر أجداً: متلازمة ستيفن جونسون (طفح حاد على الجان يشمل الأعشية المخاطية ويأخذ مسار الحمى).

نادراً: طنين في الاذن، اضطرابات في الرؤية تنتج من تفاعلات الجهاز العصبي المركزي (مثل الدوار أو الارتباك)، خلل أو فقد الاحساس بالشم أو فقد حاسة الشم أوحاسة التذوق أعضَاء الحس: مَنكررُ خَلَّالُ فَي تَدُوقُ الطَّعلى ﴿ لَحَلِقازُ اصْرَابَاتَ فِي الرَّوْيَةُ ۚ الجهارُ اللولي والأعضاء التناسلية؛ أحداثاً: عدى فطرا المونيايا في المهالِ (طلع)، التهاب المهالُ

التنافع ألمنطية بشور ز نصرات أن المقارات رفائف التكر (بيكل السائي ريكة مترسطة في بعض الاتوبيت و / أو العسارة السفراوية) أحيثة (زيدة في بعض الاتربيت (جاما ــ جارتابيل الله البيئد أميلز) نفس في عد خلايا المرافع البيشاء نفس في مستويك المروقرومين / زيدة في الMI (مقليس لعراسا تجلط الشر)، كلرة اليوزينيك (زيادة في مستوى يعض خلايا العر المعينة)، كان ة المستجت (زيادة عد الصفاح لدموية في الدر)، قلة الصفيحات (قلة الصفائح الدموية في الدر)، أنيميا. المراقب المرا

حفظ الدواء بعيدًا عن متناول أيدى الأطفال.

• اتبع بدقة استشارة الطبيب، وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، و تعليمات الصيدلي الذي صرف لك النواء ان هذا الدوام • مستحضر طبي بوثر على صحتك واستعماله خلاقاً للتعليمات بعرضك للخطر . لا تَقطع العلاج قبل المدة المحددة لك من تلقاء نفسك.

 فالطبيب والصيدان هما الخبيران بالدواء، وبنفعه وضرره
 لا تكرر صرف الدواء دون استشارة الطبيب العيوة: علية تحتوى على ٥ أقراص مُعَلَقة + نشرة داخلية . إنتاج: شركة المهن الطيبة للأدوية

وسلطات الاسماعطية مصو تاريخ الأُصدار: ١٣ / ٣ / ٧٠٠٧، تَاريخ السراجعة: ٢٠١٨ / ٢٠١٣



