

150225022014

PERDERM Cream, Ointment

Brand of alclometasone dipropionate
FOR DERMATOLOGIC USE ONLY

DESCRIPTION :

Each gram of PERDERM Cream contains 0.5 mg alclometasone dipropionate in a hydrophilic emollient cream vehicle.

Each gram of PERDERM Ointment contains 0.5 mg alclometasone dipropionate in an ointment vehicle.

ACTIONS :

Alclometasone dipropionate is a non-fluorinated, synthetic corticosteroid with anti-inflammatory, anti-pruritic and vasoconstrictive properties. Alclometasone can be classified among the moderate potency topical corticosteroids with an activity greater than that of hydrocortisone.

INDICATIONS AND USAGE:

PERDERM Cream or Ointment is indicated for the relief of the inflammatory and pruritic manifestations of corticosteroid-responsive dermatoses such as psoriasis, atopic dermatitis, contact dermatitis and neurodermatitis.

PERDERM Cream and Ointment are also indicated for such dermatoses in children and elderly patient as well as when the infection is covering large skin areas.

DOSAGE AND ADMINISTRATION :

A thin film of PERDERM Cream or Ointment should be applied to the affected skin area two or three times daily; massage gently until the medication disappears.

ADVERSE REACTIONS :

Reported rarely with PERDERM Cream use were : itching, burning, erythema, dryness, irritation, papular rashes.

Reported rarely with PERDERM Ointment use were : itching, burning, erythema.

Other local adverse reactions reported with the use of topical corticosteroids, especially under occlusive dressings, include folliculitis, hypertrichosis, acneiform eruptions, hypopigmentation, perioral dermatitis, allergic contact dermatitis, maceration of the skin, secondary infection, skin atrophy, striae and miliaria.

CONTRAINDICATIONS :

PERDERM Cream or Ointment is contraindicated in those patients with a history of sensitivity reactions to any of its components or to other corticosteroids.

PRECAUTIONS :

Any of the side effects that are reported following systemic use of corticosteroids including adrenal suppression, may also occur with topical corticosteroids, especially in infants & children.

If irritation or sensitization develops with the use PERDERM Cream or Ointment, treatment should be discontinued and appropriate therapy instituted. In the presence of an infection, an appropriate antifungal or antibacterial agent should be administered if a favorable response does not occur promptly, the corticosteroid should be discontinued until the infection has been controlled adequately. Systemic absorption of topical corticosteroids will be increased if extensive body surface areas are treated or if the occlusive technique is used. Suitable precautions should be taken under these conditions or when long-term use is anticipated, particularly in infants and children. Since safety of the use of PERDERM Cream or Ointment in pregnant women has not been established drugs of this class should not be used on pregnant patients in large amounts or for prolonged periods of time. Cautions should be exercised when PERDERM Cream or Ointment is administered to a nursing woman. PERDERM Cream or Ointment is not for ophthalmic use.

HOW SUPPLIED:

PERDERM Cream, tubes of 10 gm.

PERDERM Ointment, tubes of 10 gm.

STORAGE: Store between 2°and 30°C.

Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Medical Union Pharmaceuticals,

Abu-Sultan, Ismailia, Egypt.

Issue date:18/9/2003, Revision date: 1/3/2015



150225022014

پر درم كريم ومرهم

الكلوميتازون دايبوربيونات
للاستعمال الجلدي فقط

الوصف :

يحتوي كل جرام من كريم بردرم على ٠,٥ مجم الكلوميتازون دايبوربيونات في قاعدة كريم ملطفة. يحتوي كل جرام من مرهم بردرم على ٠,٥ مجم الكلوميتازون دايبوربيونات في قاعدة مرهم.

التأثير:

الكلوميتازون دايبوربيونات مركب كورتيكوستيرويدي مخلوق لا يحتوي على فلورين ذو خواص مضادة للالتهاب ومضادة للحكة وقابضة للأوعية الدموية. ويمكن ادراج الالكلوميتازون بين مركبات الكورتيكوستيرويدات المتوسطة القوة ذات التأثير الأقوى من تأثير الهيدروكورتيزون.

دواعي الاستعمال :

يستعمل كريم ومرهم بردرم لعلاج اعراض الالتهاب والحكة المصاحبة للأمراض الجلدية التي تستجيب للعلاج بالكورتيكوستيرويدات مثل الصدفية، الاكزيما الوراثية، اكزيما التلامس والاكزيما العصبية. كما ينصح باستعمال كريم ومرهم بردرم على الجلد المصاب مرتين أو ثلاثة مرات يوميا، وتلك برفق حتى يختفي الكريم أو المرهم.

الآثار الجانبية :

قد يصحب استعمال كريم بردرم آثار جانبية نادرة الحدوث مثل الحكة، الحرقان، احمرار الجلد، تهيج الجلد، طفح. والآثار الجانبية التي قد تحدث نادراً مع استعمال مرهم بردرم هي الحكة، الحرقان، احمرار الجلد. لوحظ مع الاستعمال الموضعي لمركبات الكورتيزون، وخاصة عند استعمال الضمادات المغلفة الآثار الجانبية التي تتضمن : التهاب بصيلات الشعر، زيادة كثافة الشعر، طفح شبيه بحب الشباب، ابيضاض الجلد، التهاب حول الفم، التهاب جلدي بحساسية التلامس، تعطن الجلد، العدوى الثانوية وضمور الجلد.

موانع الاستعمال:

لا يستعمل كريم أو مرهم بردرم للمرضى ذوى الحساسية لأى من مكوناته أو لمركبات الكورتيزون الأخرى.

الاحتياطات :

أى من الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها بعد استخدام الكورتيزون جهازياً بما فيها المثبطة و المهبطة للغدة الكظرية ممكن أيضاً حدوثها عند استعمال الكورتيزون الموضعي وخاصة في الرضع و الأطفال.

يجب إيقاف استخدام كريم أو مرهم بردرم في حالة حدوث تهيج أو حساسية نحوه واستعمال العلاج المناسب. في حالة وجود عدوى يجب استعمال علاج مناسب ضد البكتيريا أو الفطريات. اذا لم يحدث تحسن سريع للحالة يجب إيقاف العلاج بالكورتيزون حتى يتم علاج العدوى بدرجة كافية. يزيد امتصاص الجسم لمركبات الكورتيزون عند علاج مساحات كبيرة من سطح الجسم أو عند اللجوء لاستعمال الضمادات المغلفة. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لفترات طويلة وخاصة في الأطفال والرضع حيث انه لم تثبت بعد سلامة استعمال كريم أو مرهم بردرم أثناء الحمل، لذا لا يجب ان تستعمل هذه الأدوية بكميات كبيرة أو لفترات طويلة للسيدات الحوامل. يجب اتخاذ الحيطة عند استخدام كريم أو مرهم بردرم لدى السيدات المرضعات. لا يستعمل كريم أو مرهم بردرم للعين.

العبوة :

كريم بردرم: انبوبة تحتوي على ١٠ جم

مرهم بردرم: انبوبة تحتوي على ١٠ جم

شروط التخزين: يحفظ في درجة حرارة بين ٢م إلى ٣٠م.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

إنتاج: شركة المهن الطبية للأدوية

أبوسلطان - الإسماعيلية - مصر

تاريخ الإصدار: ٢٠٠٣/٩/١٨، تاريخ المراجعة: ٢٠١٥/٣/١